



Historia Clínica Electrónica Oncológica

Rol Hospital de día

Contenido

Ingreso:	2
Lista de espera:	2
Paciente:	2
Tratamiento sistémico:	2
Hospital de día:	2
<i>Pre medicación:</i>	3
<i>Indicación del plan:</i>	3
<i>Post-medicación:</i>	4
<i>Valoración de enfermería:</i>	4

Ingreso:

- URL: <https://10.240.61.71:20023/HCEO/servlet/login>
<https://hceo.hcen.salud.uy/HCEO/servlet/login>
<https://hceo.asse/HCEO/servlet/login>
- Usuario: Cédula de Identidad.
- Contraseña: Una personal.

Lista de espera:

Muestra los pacientes coordinados para la realización del tratamiento. Por defecto el filtro es la fecha del día y estado Reservado.

Dentro de los filtros de Estado tenemos:

- **Todos:** Muestra toda la lista de pacientes.
- **Firmado:** Pacientes que fueron atendidos y como proceso de culminación de la consulta se firma la historia.
- **Reservado:** Pacientes que están esperando para ser atendidos
- **Pendiente de firmar:** Pacientes en los cuales se ingresó en la historia y por algún motivo no se firmó la consulta.
- **No concurrió:** Pacientes que no concurrieron.
- **Pendientes:** Igual que reservado






Paciente	Fecha	Hora	Documento	Estado	Requiere autorización
APELLIDO191 NOMBRE191	24/05/18	16:45	111111191	Reservado	No


Paciente:

Tratamiento sistémico:

Hospital de día:


Una vez en el paciente, se debe clicar en tratamientos sistémicos, hospital de día. Para realizar los registros correspondientes se debe hacer clic en *Hospital de día*, se visualiza la fecha del tratamiento indicado. Para poder escribir en la historia hacer clic en [Escribir nuevo hospital de día](#).


-  Ver historia
-  Tratamientos sistémicos
Indicar tratamientos
-  Hospital de día
-  Coordinar hospital de día
-  Finalizar consulta

Hospital de día 

mama

mama

Serie 1 indicada el 24/05/18  [Escribir nuevo hospital de día](#)

Clic en  para agregar el control de enfermería, se despliegan los campos para indicar el peso, talla, PA, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación y diuresis. Se pueden comparar con los controles anteriores.

Nombre191 Apellido191 | Edad: 43 años | CI: 111111191 | N° HC | 


mama Serie 1 indicada el 24/05/18

Para añadir un nuevo control del 24/05/18 seleccione 


Fecha/Hora	Peso (kg)	Talla (cm)	Presión arterial	Frecuencia cardíaca	Temperatura	Saturación	Diuresis
24/05/18 16:41	0,00	0,00	ej: 11/7	0	0,00	0	


Pre medicación:

Permite realizar comentarios de la pre medicación siempre y cuando el médico haya registrado en éste campo

 Pre-medicación (Seleccione las premedicaciones a administrar)

En Domicilio: Dexametasona 8 mg v/o 2 veces por día por 3 días comenzando el día previo a la QT (el paciente debe recibir por lo menos 3 dosis previo al tratamiento) * Ranitidina 1 compr v/o cada 12 horas mientras recibe corticoides *Si no se administró Dexametasona previo al tratamiento, se debe retrasar la Infusión de Docetaxel hasta el próximo día. Si el retraso del tratamiento no es posible, administrar: Difenhidramina 50 mg i/v + Dexametasona 10 mg i/v 30 minutos antes de Docetaxel. Esta premedicación no reduce la incidencia y severidad de la retención hídrica.

 En Domicilio: Dexametasona 8 mg v/o 2 veces por día por 3 días comenzando el día previo a la QT (el paciente debe recibir por lo menos 3 dosis previo al tratamiento) * Ranitidina 1 compr v/o cada 12 horas mientras recibe corticoides *Si no se administró Dexametasona previo al tratamiento, se debe retrasar la Infusión de Docetaxel hasta el próximo día. Si el retraso del tratamiento no es posible, administrar: Difenhidramina 50 mg i/v + Dexametasona 10 mg i/v 30 minutos antes de Docetaxel. Esta premedicación no reduce la incidencia y severidad de la retención hídrica.

24/05/18 

Indicación del plan:

Figuran los medicamentos del protocolo que deben ser administrados. Si se administra correctamente la medicación al paciente, se despliega un campo de texto libre para poder registrar.

En caso de que se suspenda la medicación también se despliega un campo de texto libre para registrar el motivo de suspensión.

Indicación del plan (Seleccione el/los principios activos a administrar)

Monoquimioterapia

Administrar

Suspender

Docetaxel

Medicamentos indicados y/o suspendidos

Docetaxel 24/05/18 ✓

Docetaxel. Via de administración: IV. Día/s: Dosis: 75 mg/m2, dosis total por día: 108 Dosis carga, dosis total por ciclo mg. Otras indicaciones:

Escribe aquí el cumplimiento de la indicación médica

Post-medicación:

Permite realizar comentarios de la pre medicación siempre y cuando el médico haya registrado en éste campo

Post medicaciones (Seleccione las postmedicaciones a administrar)

En Domicilio: Dexametasona 8 mg v/o 2 veces por día por 3 días comenzando el día previo a la QT. (el paciente debe recibir por lo menos 3 dosis previo al tratamiento) * Ranitidina 1 compr v/o cada 12 horas mientras recibe corticoídes



En Domicilio: Dexametasona 8 mg v/o 2 veces por día por 3 días comenzando el día previo a la QT (el paciente debe recibir por lo menos 3 dosis previo al tratamiento) * Ranitidina 1 compr v/o cada 12 horas mientras recibe corticoídes

24/05/18

Escribe aquí el cumplimiento de la indicación médica

Valoración de enfermería:

Campo de texto libre.

Valoración de enfermería